◆レジメンマスタ確認シート◆

【RAM+PTX　（2回目以降）】

レジメン番号　26230196

対象がん種　胃がん

レジメン名　RAM+PTX　(2回目以降)

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：血管確保。	1	本								○																				
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00-12:30　30分かけて ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F：開始時ﾚｽﾀﾐﾝ5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 1	本 A V								○																				
3	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:30 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：血管確保。	1	本	○														○													
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:30-13:00　30分かけて ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F：開始時ﾚｽﾀﾐﾝ5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 1	本 A V	○														○													
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:00-13:30　30分かけて 劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(500mg 50mL) 劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(100mg 10mL) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：全量250mL ﾌｨﾙﾀｰ使用。調製後室温、4時間以内に使用。	8 8 1	8.8 mg/kg 8.8 mg/kg 本	○														○													
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:00-14:00　1時間かけて 毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：前投薬終了後30分で開始。ﾌｨﾙﾀｰ使用。	80 1	88 mg/㎡ 本								○																				

<次頁に続く>

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

【RAM+PTX　（2回目以降）】

レジメン番号　26230196

対象がん種　胃がん

レジメン名　RAM+PTX　(2回目以降)

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:30-14:30　1時間かけて			○														○													
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注「NK」(30mg 5mL)	80	88 mg/㎡																												
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1	本																												
	◆施行者Ｆ：ﾌｨﾙﾀｰ使用。																														
	<<以下余白>>																														

備考	