

【MK:nab-PTX+RAM (初回)】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26230241

対象がん種 胃がん

レジメン名 MK:nab-PTX+RAM (初回)

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																													
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	★一時点滴 (レジメン) 12:30 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保。	1	本	○																												
2	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] デキササート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1	本 V	○																												
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 毒 必)★アプ ラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液PL「フソー」 (50mL) ◆施行者F:フィルター【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。	100 1	110 mg/m ² 本																													
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 サイラムサ 点滴静注液(500mg 50mL) 劇 サイラムサ 点滴静注液(100mg 10mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:フィルター(使用) 全量250mL。調製後室温、4時間以内に使用。	8 8 1	8.8 mg/kg 8.8 mg/kg 本																													
5	★側管点滴 (レジメン) 13:00-14:00 1時間かけて 劇 サイラムサ 点滴静注液(500mg 50mL) 劇 サイラムサ 点滴静注液(100mg 10mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:フィルター(使用) 全量250mL。調製後室温、4時間以内に使用。	8 8 1	8.8 mg/kg 8.8 mg/kg 本	○																												
6	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 毒 必)★アプ ラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液PL「フソー」 (50mL) ◆施行者F:フィルター【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。	100 1	110 mg/m ² 本																													
7	★側管点滴 (レジメン) 14:00-14:30 30分かけて 毒 必)★アプ ラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液PL「フソー」 (50mL) ◆施行者F:フィルター【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。	100 1	110 mg/m ² 本	○																												
				<<以下余白>>																												

備考	レスタミン前投薬あり。
----	-------------

