◆レジメンマスタ確認シート◆

【MK：nab－PTX＋RAM （２回目以降）】

レジメン番号　26230245

対象がん種　胃がん

レジメン名　MK:nab-PTX＋RAM (2回目以降)

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30			
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：血管確保。			
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30-13:00	30分かけて		
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30	30分かけて		
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ 点滴静注液(500mg 50mL)	8	8.8	mg/kg
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ 点滴静注液(100mg 10mL)	8	8.8	mg/kg
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：ﾌｨﾙﾀｰ(使用) 全量250mL。調製後室温、4時間以内に使用。			
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30	30分かけて		
	毒 必)★ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用100mg	100	110	mg/㎡
	生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ (50mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：ﾌｨﾙﾀｰ【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。			
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-14:00	30分かけて		
	毒 必)★ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用100mg	100	110	mg/㎡
	生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ (50mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：ﾌｨﾙﾀｰ【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。			

<<以下余白>>

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	○							○							○													
2	○							○							○													
3	○														○													
4								○																				
5	○														○													

備考	ﾚｽﾀﾐﾝ前投薬あり。