◆レジメンマスタ確認シート◆

【G-B （90mg/㎡） サイクル2以降】

レジメン番号　34081221

対象がん種　低悪性度リンパ腫

レジメン名　G-B（90mg/㎡）サイクル2以降

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00			
	生理食塩液ﾊﾞｯｸ(500mL)	1		本
	◆施行者F：ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与60分前迄にｽﾃﾛｲﾄﾞ、ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ、ﾚｽﾀﾐﾝ投与完了			
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:30-11:00 30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本
3	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00			
	劇 ガザイバ点滴静注(1000mg40mL)	1000	1000	mg
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：全量250mL。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ。別表参照。			
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-12:00 1時間かけて			
	劇 ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注用（100mg）	90	99	mg/㎡
	劇 ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注用（２５ｍｇ）	90	99	mg/㎡
	必)注射用水（１００mL）	1		本
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	250		mL
	◆施行者F：輸液ポンプ使用。ﾄﾚｱｷｼﾝは注射用水で溶解(40mL/V)。全量250mL。			

<<以下余白>>

	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		○																											
2			○	○																									
3		○																											
4			○	○																									

備考	トレアキシンはST合剤、帯状疱疹予防をすること。