◆レジメンマスタ確認シート◆

【A-AVD】

レジメン番号　34081230

対象がん種　リンパ腫

レジメン名　A-AVD

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00			○														○													
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本																												
	◆施行者Ｆ：血管確保。																														
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:30-11:00　30分かけて			○														○													
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1	本																												
3	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00			○														○													
	劇 エクザール注射用 (10mg)	6 mg/㎡	10 mg																												
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																												
	◆施行者Ｆ：全開で																														
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:05-12:05　1時間かけて			○														○													
	劇 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注｢ｻﾝﾄﾞ｣50mg25mL	25	27.5 mg/㎡																												
	劇 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注｢ｻﾝﾄﾞ｣10mg5mL	25	27.5 mg/㎡																												
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																												
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:05-14:05　2時間かけて			○														○													
	劇 ダカルバジン注用100 (100mg)	375	412.5 mg/㎡																												
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	1	本																												
	必)注射用水（１００mL)	1	本																												
	◆施行者Ｆ：直前溶解。ルート遮光。ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝは注射用水で溶解																														
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:05-14:35　30分かけて			○														○													
	劇 必)ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ点滴静注用 (50mg)	1.2	1.32 mg/kg																												
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																												
	必)注射用水（１００mL)	1	本																												
	◆施行者Ｆ：1Vあたり注射用水10.5mLで溶解。0.4～1.2mg/mLに調製。																														
	<<以下余白>>																														

備考	ｴｸｻﾞｰﾙ10mg/bodyまで。ｱﾄﾞｾﾄﾘｽは必要時にﾚｽﾀﾐﾝ・ｶﾛﾅｰﾙの前投薬