

【R(リツキシマフ・BS) - トレアキシシ (60mg/m²)】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 34081045

対象がん種 低悪性度リンパ腫

レジメン名 R(リツキシマフ・BS) - トレアキシシ (60mg/m²)

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				d12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	★一時点滴 (レジメン) 10:00-16:00 6時間かけて 生理食塩液ハック (500mL)	1	本	○																											
2	★側管点滴 (レジメン) 10:30-11:00 30分かけて 劇ク・ラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL)	1	本		○	○																									
3	★側管一時点滴 (レジメン) 11:00 リツキシマフ・BS点滴静注 (500mg 50mL) リツキシマフ・BS点滴静注 (100mg 10mL) 生理食塩液ハック (500mL) ◆施行者F: 初回1時間毎25>100>200mL/h 2回目以降30分毎100>200>300>400mL/h	375 375 337.5 mL/m ²	412.5 mg/m ² 412.5 mg/m ² 0		○																										
4	★側管点滴 (レジメン) 11:00-12:00 1時間かけて 劇 トレアキシシ点滴静注用 (100mg) 劇 トレアキシシ点滴静注用 (25mg) 必) 注射用水 (100mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 輸液ポンプ使用。注射用水で溶解。全量250mL。	60 60 1 1	66 mg/m ² 66 mg/m ² 本 本		○	○																									
<<以下余白>>																															

備考 ST合剤、帯状疱疹予防をすること

