# ◆レジメンマスタ確認シート◆

## 【【Dara皮下注】DCd　サイクル7以降】

レジメン番号　34091155

対象がん種　骨髄腫

レジメン名　【Dara皮下注】DCd　ｻｲｸﾙ7以降

インターバル日数　28日

| Rp | 薬品名 | 標準値 | 上限値 | d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　10:30<br>ﾃﾙﾓ生食　(100mL)［生理食塩液］<br>◆施行者Ｆ：血管確保　ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与日はﾚｽﾀﾐﾝ　ｶﾛﾅｰﾙ　ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ内服 | 1 | 本 | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2 | ★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　10:30-11:00　30分かけて<br>劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)<br>◆施行者Ｆ：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ投与確認 | 1 | 本 | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 3 | ★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00<br>ブドウ糖［大塚糖液］　5%　(20mL)<br>◆施行者Ｆ：カイプロリス投与前ﾌﾗｯｼｭ用 | 1 | A | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 4 | ★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00-11:30　30分かけて<br>毒 ★ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ点滴静注用(40mg)<br>毒 ★ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ点滴静注用(10mg)<br>ブドウ糖［ﾃﾙﾓ糖注］　5%　(100mL)<br>必)注射用水（１００mL） | 56 mg/㎡<br>56 mg/㎡<br>1<br>1 | 123.2 mg<br>123.2 mg<br>本<br>本 | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 5 | ★皮下注射（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:30<br>劇 試)ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ配合皮下注1800mg15mL<br>◆施行者Ｆ：3～5分かけて。 | 1800 | 1800 mg | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:30<br>ブドウ糖［大塚糖液］　5%　(20mL)<br>◆施行者Ｆ：カイプロリス投与後ﾌﾗｯｼｭ用 | 1 | A | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |

<<以下余白>>

| 備考 | d1 2 8 9 15 16にデキサメタゾン20mg/body d22に40mg/body内服 |
|---|---|