

◆レジメンマスタ確認シート◆

【dd EC(90/600) デキサート1.5V】

レジメン番号 02010321

対象がん種 乳がん

レジメン名 dd EC(90/600) デキサート1.5V

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																										
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保。側管終了時抜針・終了。	1	本	○																									
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴パケット「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F: 採血結果よければ開始。	1 1.5	本 V	○																									
3	★側管一時点滴 (レジメン) 13:30 劇 エピ®ルビシン塩酸塩注(50mg 25mL) 劇 エピ®ルビシン塩酸塩注(10mg 5mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 前投薬終了後全開で。生食50mL抜く。	90 90 50	99 mg/m ² 99 mg/m ² mL	○																									
4	★側管点滴 (レジメン) 13:35-14:35 1時間かけて 劇 エンドキサン注【500mg】 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: エピルビシン終了後。	600 1	660 mg/m ² 本	○																									
5	★皮下注射 (レジメン) 15:00 シ®ーラストSCシリシ® (3.6mg 0.36mL) ◆施行者F: エンドキサン終了後24~72時間	1	本				○																						
	<<以下余白>>																												

備考 前投薬投与30分前にイメンド125mg内服

