

◆レジメンマスタ確認シート◆

【FEC(100) デキサート1.5V】

レジメン番号 02010071

対象がん種 乳がん

レジメン名 FEC(100) デキサート1.5V

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保。側管終了時抜針・終了。	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F: 採血結果よければ開始。	1 1.5	本 V	○																				
3	★側管一時点滴 (レジメン) 13:30 劇 後】エピルビシン塩酸塩注(50mg 25mL) 劇 後】エピルビシン塩酸塩注(10mg 5mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 前投薬終了後全開で。生食50mL抜く。	100 100 50	110 mg/m ² 110 mg/m ² mL	○																				
4	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 エンドキサン注 [500mg] テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: エピルビシン終了後。	500 1	550 mg/m ² 本	○																				
5	★側管点滴 (レジメン) 14:00-14:30 30分かけて 劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: エンドキサン終了後。	500 1	550 mg/m ² 本	○																				
	<<以下余白>>																							

備考 前投薬投与30分前にイメシド125mg内服