

◆レジメンマスタ確認シート◆

【初回 {ハーセフ°チン(3週ごと)+PTX毎週3連投}】

レジメン番号 02010500

対象がん種 乳がん

レジメン名 初回 {ハーセフ°チン(3週ごと)+PTX毎週3連投}

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴（レジメン） 13:00 生理食塩液「ハック」(500mL) ◆施行者F：血管確保。ハーセプチン終了後3時間で残破棄・抜針終了。	1	本	○																				
2	★一時点滴（レジメン） 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F：血管確保。側管終了後抜針・終了。	1	本						○								○							
3	★側管点滴（レジメン） 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食（100mL）[生理食塩液] ファモチシン静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F：開始と同時にレスタミン5T内服	1 1 1	本 A V	○																				
4	★側管点滴（レジメン） 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食（100mL）[生理食塩液] ファモチシン静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F：開始時レスタミン5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 0.5	本 A V						○								○							
5	★側管点滴（レジメン） 14:00-15:00 1時間かけて 毒 ★ハ°クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F：ファモチシン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	80 1	88 mg/m ² 本	○					○								○							
6	★側管点滴（レジメン） 15:00-16:30 90分かけて ハーセプチン注用（150mg）(希釈液無) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F：8mg/kg	8 1	8.8 mg/kg 本	○																				
	<<以下余白>>																							

備考