

## ◆レジメンマスタ確認シート◆

## 【ハーセフ°チン+ケ°ムシタヒ°ン（初回）】

レジメン番号

02010840

対象がん種

乳がん

レジメン名

ハーセフ°チン+ケ°ムシタヒ°ン（初回）

インターバル日数 21日

| Rp | 薬品名                                                                                                           | 標準値               | 上限値                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                                                                                                               |                   |                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1  | ★一時点滴（レジ°メン） 13:00<br>生理食塩液ハ°ック°（500mL）<br>◆施行者F：血管確保。側管終了後抜針・終了。                                             | 1                 | 本                                                     | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | ★一時点滴（レジ°メン） 13:00<br>テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕<br>◆施行者F：血管確保。                                                      | 1                 | 本                                                     |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | ★側管点滴（レジ°メン） 13:00-13:30 30分かけて<br>テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕<br>デキサート注射液（6.6mg 2mL）                                 | 1<br>1            | 本<br>V                                                |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | ★側管点滴（レジ°メン） 13:00-14:30 90分かけて<br>ハーセフ°チン注用（150mg）（希釈液無）<br>生理食塩液「ヒカリ」（250mL）<br>◆施行者F：初回8mg/kg。             | 8<br>1            | 8.8 mg/kg<br>本                                        | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | ★側管点滴（レジ°メン） 13:30-14:00 30分かけて<br>劇 ケ°ムシタヒ°ン静注「ヤクルト」【1g】<br>劇 ケ°ムシタヒ°ン静注「ヤクルト」（200mg）<br>テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕 | 1250<br>1250<br>1 | 1375 mg/m <sup>2</sup><br>1375 mg/m <sup>2</sup><br>本 |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | ★側管点滴（レジ°メン） 15:00-15:30 30分かけて<br>テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕<br>デキサート注射液（6.6mg 2mL）                                 | 1<br>1            | 本<br>V                                                | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | ★側管点滴（レジ°メン） 15:30-16:00 30分かけて<br>劇 ケ°ムシタヒ°ン静注「ヤクルト」【1g】<br>劇 ケ°ムシタヒ°ン静注「ヤクルト」（200mg）<br>テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕 | 1250<br>1250<br>1 | 1375 mg/m <sup>2</sup><br>1375 mg/m <sup>2</sup><br>本 | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | <<以下余白>>                                                                                                      |                   |                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

備考

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |