

## ◆レジメンマスタ確認シート◆

【ハ°ーシ°ェタ十ハーセフ°チン十ト°セタキセル（2回目以降）】

レジメン番号 02010590

対象がん種 乳がん

レジメン名 ハ°ーシ°ェタ十ハーセフ°チン十ト°セタキセル（2回目以降）

インターバル日数 21日

| Rp | 薬品名                                                                                                                                        | 標準値           | 上限値                                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                                                                                                                                            |               |                                                       | d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1  | ★一時点滴（レシメン） 13:00<br>生理食塩液「ヒカリ」（250mL）<br>◆施行者F：血管確保。側管終了後抜針・終了。                                                                           | 1             | 本                                                     | ○  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | ★側管点滴（レシメン） 13:00-13:30 30分かけて<br>劇 ハーシエタ点滴静注 420mg 14mL<br>生理食塩液「ヒカリ」（250mL）<br>◆施行者F：投与終了後30分経過観察し、その後HER投与へ。                            | 420<br>1      | 420 mg<br>本                                           | ○  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | ★側管点滴（レシメン） 14:00-14:30 30分かけて<br>ハーセフチン注用（150mg）（希釈液無）<br>生理食塩液「ヒカリ」（250mL）<br>◆施行者F：6mg/kg。初回インフュージョンリアクションあれば90分で。                      | 6<br>1        | 8 mg/kg<br>本                                          | ○  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | ★側管点滴（レシメン） 14:30-15:00 30分かけて<br>テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕<br>デキサート注射液（6.6mg 2mL）                                                               | 1<br>1        | 本<br>V                                                | ○  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | ★側管点滴（レシメン） 15:00-16:00 1時間かけて<br>毒 ★トセタキセル注ニフロ80mg4mL<br>毒 ★トセタキセル注ニフロ20mg1mL<br>ブドウ糖〔光糖液〕 5%（250mL）<br>◆施行者F：トセタキセル使用前から使用後までフローズングローブ使用 | 75<br>75<br>1 | 82.5 mg/m <sup>2</sup><br>82.5 mg/m <sup>2</sup><br>本 | ○  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | <<以下余白>>                                                                                                                                   |               |                                                       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

備考