◆レジメンマスタ確認シート◆

【PCE （初回） 】

レジメン番号　07280160

対象がん種　頭頸部癌

レジメン名　PCE（初回）

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00				○ ○ ○
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本	
	◆施行者F：血管確保。				
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00-10:30　30分かけて				○ ○
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V	
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)「日新」	1		A	
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A	
	◆施行者F：問題なければ次回よりﾃﾞｷｻｰﾄ0.5Vまで漸減可				
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00-10:30　30分かけて				○
	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」 (50mL)	1		本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V	
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A	
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:30-11:00　30分かけて				○ ○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本	
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-12:00　1時間かけて				○ ○
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注「NK」(30mg 5mL)	100	110	mg/㎡	
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本	
	◆施行者F：前投薬終了後30分で開始。ﾌｨﾙﾀｰ使用。				
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-12:00　1時間かけて				○
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	250	275	mg/㎡	
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本	
	◆施行者F：0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始し終了後1hr経過観察				
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-13:00　1時間かけて				○ ○
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	2.5	2.75	AUC	
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		2.75	AUC	
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本	

<次頁に続く>

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

【PCE （初回） 】

レジメン番号　07280160

対象がん種　頭頚部癌

レジメン名　PCE（初回）

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
8	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-14:00　1時間かけて			
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	250	275	mg/㎡
	生理食塩液[ﾋｶﾘ](250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。投与終了後1hr経過観察			
9	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-15:00　2時間かけて			
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	400	440	mg/㎡
	生理食塩液[ﾋｶﾘ](250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。投与終了後1hr経過観察			

<<以下余白>>

d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
○							○													
○																				

備考	